

Istruzioni passo a passo per l'iniezione di Clexane[®] con siringhe preriempite

(enoxaparin sodium)



Il medico o l'infermiere dovrebbero spiegarti come usare Clexane e come effettuare correttamente l'auto-iniezione. Se hai domande sul medicinale o su come praticare l'iniezione, chiedi consiglio al medico.

Prima dell'iniezione


- ▶ Lava e asciuga le mani
- ▶ Controlla che la siringa non sia scaduta sull'etichetta o sulla scatola
- ▶ Assicurati che la siringa non sia danneggiata e che il medicinale sia una soluzione limpida senza particelle
- ▶ Preparazione del sito di iniezione:
 - Seleziona una zona sul lato destro o sinistro dell'addome, ad almeno 5 cm dall'ombelico
 - Se raccomandato dal medico, pulisci la zona selezionata per l'iniezione e lasciala asciugare.

Preparazione della siringa

1

Togli il cappuccio protettivo dall'ago. Se è presente una goccia sulla punta dell'ago, rimuovila picchiettando la siringa tenuta con l'ago rivolto verso il basso. Non espellere la bolla d'aria.

Vedi più avanti sei hai necessità di modificare la dose.*



Preparazione della plica cutanea

2

Siediti o sdraiati in una posizione comoda e afferra con delicatezza una piega nella pelle con pollice e indice in corrispondenza del sito di iniezione. **Segue sul retro.**




***REGOLAZIONE DELLA DOSE:** se il medico ti ha indicato di modificare la dose di Clexane, dovrai espellere il medicinale in eccesso in un apposito contenitore prima dell'iniezione. Tieni la siringa con la punta dell'ago rivolta verso il basso e premi lo stantuffo fino a portare la parte inferiore della bolla d'aria allo stesso livello della tacca sulla siringa corrispondente alla dose prescritta dal medico. Se il medicinale in eccesso non è espulso prima dell'iniezione, il sistema di sicurezza non si attiverà alla fine dell'iniezione. Procedi con le istruzioni al punto 2.

3

Iniezione

Inserisci l'ago nella piega della pelle a un angolo di 90° e premi quindi lo stantuffo finché tutto il medicinale non è stato erogato. Non lasciare la presa sulla piega della pelle durante l'iniezione.



4

Rimozione della siringa

Rimuovi l'ago estraendolo in linea retta, tenendo il dito sullo stantuffo.



5

Attivazione del sistema di sicurezza

Tieni l'ago lontano da te e da altre persone e attiva il sistema di sicurezza premendo con fermezza lo stantuffo. Il manicotto di protezione andrà automaticamente a coprire l'ago e sentirai un "clic".



6

Eliminazione

Getta immediatamente la siringa nel più vicino contenitore per oggetti taglienti. Quando il contenitore è pieno, consegnalo al medico o all'infermiere che provvederanno all'eliminazione.

**Cose da fare e da non fare**

- ✓ **Prendi** Clexane ogni giorno alla stessa ora, per il numero esatto di giorni indicato dal medico
- ✓ Effettua l'iniezione **alternando** ogni volta il lato destro e sinistro dell'addome
- ✓ **Chiama** immediatamente il medico se salti una dose, assumi una quantità di medicinale eccessiva o soffri di effetti collaterali
- ✓ **Rivolgiti** al medico ogniqualvolta hai domande o timori relativamente alla terapia o alle istruzioni per l'iniezione
- ✗ **NON** effettuare l'iniezione in zone che presentano lividi o cicatrici
- ✗ **NON** stringere troppo forte la piega nella pelle
- ✗ **NON** sfregare il sito di iniezione quando hai finito, potresti causare lividi

Per maggiori informazioni su Clexane, consulta il foglietto illustrativo (Consumer Medicine Information)

sanofi-aventis australia Pty Ltd operante con la denominazione sociale sanofi, ABN 31 008 558 807 Talavera Corporate Centre, Building D, 12-24 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113. Tel: +61 (0) 2 8666 2000, Fax: +61 (0) 2 8666 3000. www.sanofi.com.au. ©Clexane è un marchio commerciale registrato di sanofi-aventis. SAANZ.ENO.15.11.0371f(1). Date of preparation: December 2016. AM6814.

SANOFI 

CLEXANE[®]
Enoxaparin sodium
SAFETY LOCK