


注射 CLEXANE® Safety Lock 步骤说明



给你开具了 **Clexane Safety Lock** 处方。
如果你对药物或自我注射方法有任何问题，
请咨询你的医生。

注射Clexane Safety Lock前

检查标签或包装，确保注射器没有过期。确保注射器没有损坏，其中药物为无颗粒的澄清溶液。如果注射器损坏或药物不澄清，请勿使用。换一个新注射器。



用肥皂和水洗手以及清洗注射部位，然后擦干双手。



以一种舒适的姿势坐下或躺下，以便你可以很容易地看到你即将注射的腹部区域。理想位置是坐在躺椅上、斜躺或躺在床上且头部垫在垫高枕头上。



在腹部的左侧或右侧选取一处距肚脐至少5厘米的部位，且朝向你的一侧。

请记住，注射时交替使用注射侧（腹部左侧和右侧）。



Clexane Safety Lock注射小贴士

请务必

- ✓ 请务必按照医生指示的天数，每日在同一时间注射Clexane
- ✓ 请务必在每次注射时在不同的部位（腹部左侧和右侧）交替进行注射
- ✓ 若错过注射、注射过量或出现任何副作用，请务必立即联系你的医生
- ✓ 若关于疗程或注射说明有任何问题或疑虑，请务必同医生沟通
- ✓ 启动安全锁前，请务必将针头远离注射部位


请勿

- ✗ 针头远离皮肤前请勿启动安全锁
- ✗ 请勿在瘀青或有疤痕的部位注射
- ✗ 请勿过度用力挤捏皮肤
- ✗ 注射后，请勿揉搓注射部位，以免引起擦伤红肿

注射Clexane Safety Lock

1. 准备注射器

取下针头保护套。若针头上出现药滴，将针头向下，轻弹注射器以去除药滴。请勿喷出空气泡。如需调整剂量，请见以下剂量调整说明。[†]




2. 捏起皮肤皱襞

以舒适的姿势躺下或坐下，用大拇指和食指在注射部位轻轻捏起一块皮肤皱襞，作为注射部位。



3. 注射

将针头全长以90°角度插入捏起的皮肤皱襞中，按下针筒塞，直至所有药物注入。注射时不要松手放开皮肤皱襞。



4. 拔出注射器

注射后，垂直拔出针头，并保持手指按压在针筒塞上。




5. 启动安全锁

将针头远离自己和他人，用力按压针筒塞来启动安全锁。保护套管会自动套住针头，你会听到一声可以听到的“咔嗒”声。



6. 处置

将用过的注射器放入利器盒中。盖紧盖子，将容器放在儿童接触不到的地方。利器盒装满时，将其交给你的医生或护士处置。将未使用的药物返还给药师。请勿丢进家里的垃圾箱里。



[†]剂量调整:若你的医生指示你调整Clexane Safety Lock剂量,你需在注射前将任何多余药物挤入适当容器中。手持注射器,针头向下,按下针筒塞,使气泡底部与针筒上医生要求剂量的刻度线齐平。若注射前未挤出多余药物,则注射结束时安全锁不会启动。



关于**Clexane Safety Lock**的更多信息，
请见“Clexane消费者医药信息”并访问：

www.vtematters.com.au/resources

密码:support

(请注意, 密码区分大小写)

获取赛诺菲医疗信息, 致电1800 818 806

如果你对Clexane或你的病情有任何疑问,
请联系你的医疗保健专业人员。



Scan the QR code to watch a
video showing you how to inject
Clexane Safety Lock at home.

参考文献:1. Clexane和ClexaneForte使用说明书, 赛诺菲, 2014。

Sanofi-Aventis Australia Ptd Ltd Trading as Sanofi, ABN 31 008 558 807,
Talavera Corporate Centre, Building D, 12-24 Talavera Road, Macquarie Park,
NSW 2113. *Clexane is a registered trademark for Sanofi-Aventis.
MAT-AU-2200801. Date of preparation: March 2022. SACL24972W.

sanofi